

មហាតំបន់ស៊ីដនីភាគខាងលិច
(GREATER WESTERN SYDNEY)
ស្មៅចង្រៃជាអាទិភាព

Khmer | ភាសាខ្មែរ


FairfieldCity
Celebrating diversity

ទំព័រមាតិកា

ទំព័រលេខ៖

ទិដ្ឋភាពទូទៅ	5
ព័ត៌មានអំពីការត្រួតពិនិត្យស្មៅចង្រៃជាអាទិភាព	6
ដំណើរការត្រួតពិនិត្យអចលនទ្រព្យឯកជន	7
ស្មៅចង្រៃជាអាទិភាពរបស់រដ្ឋ៖ ការបង្ការ	8
ស្មៅចង្រៃជាអាទិភាពរបស់រដ្ឋ៖ ការលុបបំបាត់ / ការបង្ក្រាប	10
ស្មៅចង្រៃជាអាទិភាពរបស់រដ្ឋ៖ ការបង្ក្រាប	11
ស្មៅចង្រៃជាអាទិភាពនៅក្នុងតំបន់៖ ការបង្ការ	13
ស្មៅចង្រៃអាទិភាពនៅក្នុងតំបន់៖ ការលុបបំបាត់	14
ស្មៅចង្រៃជាអាទិភាពនៅក្នុងតំបន់៖ ការបង្ក្រាប	16
ស្មៅចង្រៃជាអាទិភាពនៅក្នុងតំបន់៖ ការការពារទ្រព្យសម្បត្តិ	17
វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងស្មៅចង្រៃ	18
ចំណាំ	21



ដើមដើមជ័រឆកស្លឹកតូច

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ស្មៅចង្រៃជាអាទិភាពនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានទីក្រុង Fairfield (LGA) គឺជារុក្ខជាតិដែលមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើនសុខុមាលភាពសង្គម និងសុខភាពមនុស្ស សេដ្ឋកិច្ច ភាពរស់រវើកនៃទីក្រុង និងបរិស្ថានរបស់យើង។

នៅរដ្ឋឃ្លាត (NSW) ការគ្រួតគ្រាការគ្រប់គ្រងស្មៅចង្រៃជាអាទិភាពគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនៅក្រោម ច្បាប់ជីវសន្តិសុខឆ្នាំ 2015។

កាតព្វកិច្ចទាំងនេះត្រូវបានប្រកាន់ខ្ជាប់តាមរយៈការគ្រប់គ្រងស្មៅចង្រៃជាអាទិភាពលើដីសាធារណៈ និងការគ្រួតគ្រាពិនិត្យដឹងកងរដ្ឋ ដើម្បីធានាថាម្ចាស់ ឬអ្នកកាន់កាប់ដីអនុវត្តការគ្រប់គ្រងលើស្មៅចង្រៃជាអាទិភាពនៅលើដីរបស់ពួកគេ ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យជីវសន្តិសុខ។

កម្មវិធីទាំងនេះស្វែងរកការប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានកំណត់របស់យើង ដើម្បីបង្កើនបានជាអតិបរមានូវការបង្ក្រាបស្មៅចង្រៃជាអាទិភាពតាមវិធីសាស្ត្រជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយ។ យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងស្មៅចង្រៃឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងសក្តិសិទ្ធិបំផុតគឺការបង្ការ។

ការងារគ្រួតគ្រាពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងច្បាប់សាលាសង្កាត់គឺផ្ដោតលើផ្នែកនានាដូចខាងក្រោម៖

- នៅតាមបណ្តោយផ្លូវបង្ហូរទឹក
- ព្រែក ឬអូរធម្មជាតិក្នុងរូង និង
- នៅជាប់នឹងដីព្រៃបម្រុង។

ការគ្រប់គ្រងស្មៅចង្រៃប្រកបដោយជោគជ័យពឹងផ្អែកលើការតាមដាន បន្ទាប់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដកយកចេញដំបូង។

របៀបដែលស្មៅចង្រៃរីករាលដាល

ស្មៅចង្រៃបង្ហាញប្រព័ន្ធអេកូធម្មជាតិ និងដាក់កំហិតលើការប្រើប្រាស់ដីឱ្យបានល្អបំផុត។

ស្មៅចង្រៃត្រូវបានរីករាលដាលដោយយន្តការជាច្រើន៖

- ការចាក់ចោលកំណត់មែកឈើក្នុងរូងទឹកឱ្យទៅលើផ្លូវបម្រុង ដីទំនេរ លើរបង ឬនៅក្បែរព្រែកម្តោក
- បក្សី និងសត្វនានានាំយកស្មៅចង្រៃទាំងនោះមកជាប់តាមស្លាប រោម និងតាមរយៈប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់វា
- ខ្យល់ ទឹក និងសំណឹក។

វិធីបង្ការការរីករាលដាល

ដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលនៃស្មៅចង្រៃនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង និងតំបន់ជនបទរបស់យើងនៅទីក្រុង Fairfield៖

បញ្ឈប់ការចោលសំណល់ស្លន់ច្បារពាសដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្ន។

ស្វែងយល់ថាតើស្មៅចង្រៃណាខ្លះអាចធ្វើទៅជាជីកំប៉ុសដោយសុវត្ថិភាព ហើយស្មៅចង្រៃណាខ្លះត្រូវយកទៅកន្លែងចាក់សំណល់តែប៉ុណ្ណោះ។

សម្អាតឧបករណ៍ថែសួនដែលអ្នកបានប្រើវានៅលើស្មៅដើម្បីបង្ការការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ពូជ។

របៀបដែលស្មៅចង្រៃអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នក

ប្រភេទរុក្ខជាតិផ្សេងៗគ្នាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដោយបង្កឱ្យមានជំងឺហឺត រោគផ្តាសាយគឺងច្រមុះ រោគរលាកស្បែក ជំងឺភ្នែកក្រហម និងរោគភ្នែកមានភាពរលើបចំពោះកាំរស្មី (ពន្លឺ)។

រុក្ខជាតិផ្សេងទៀតមានបន្ទាត់ដែលអាចបោះទាំងស្បែកសត្វ និងស្បែកមនុស្ស។ នេះអាចបណ្តាលឱ្យរងរបួសរាងកាយ។

របៀបដែលស្មៅចង្រៃអាចប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន

នៅតំបន់ដីកម្តៅ និងតំបន់ធម្មជាតិ ស្មៅចង្រៃអាចបង្ក្រាបរុក្ខជាតិក្នុងស្រុក ហើយដុះប្រកួតប្រជែងដណ្តើមលំហ ពន្លឺ និងទឹកពីរុក្ខជាតិក្នុងស្រុក។ ស្មៅចង្រៃក៏អាចផ្លាស់ប្តូររដូវកាលនៃសារធាតុចិញ្ចឹម ភាពចម្រុះនៃរុក្ខជាតិ សត្វ និងរដូវកាលនៃទឹកផងដែរ។

របៀបដែលស្មៅចង្រៃអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច

ស្មៅចង្រៃកាត់បន្ថយតម្លៃ គុណភាព និងបរិមាណផលិតផលដំណាំវិស័យកសិកម្ម។ ស្មៅចង្រៃក៏មានផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចលើវិស័យទេសចរណ៍ និងលក្ខណៈពិសេសនៃទេសភាពដែលជំរុញឱ្យមានភាពទាក់ទាញផងដែរ។

អ្វីដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើអ្នកទទួលបានការជូនដំណឹង

ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានការជូនដំណឹងពីសាលាសង្កាត់ទាក់ទងនឹងការគ្រួតគ្រាពិនិត្យអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក (នៅក្រោមផ្នែកទី 98) សូមសូមកុំទើបទាល់ក្នុងការទាក់ទងសាលាសង្កាត់ ដើម្បីរៀបចំពេលវេលាសមស្របនឹងអ្នក បើមិនដូច្នោះទេ ការគ្រួតគ្រាពិនិត្យនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចន្លោះកាលបរិច្ឆេទដែលបានផ្តល់ឱ្យនៅលើការជូនដំណឹងនោះ។

ការត្រួតពិនិត្យស្មៅចង្រៃជាអាទិភាព

នៅក្រោមផ្នែកទី 3 នៃច្បាប់ជីវសន្តិសុខឆ្នាំ 2015 - កាតព្វកិច្ចទូទៅនៃជីវសន្តិសុខចែងថាបុគ្គលណាម្នាក់ដែលដឹង ឬគួរតែដឹងដោយសមហេតុផលពីហានិភ័យជីវសន្តិសុខដែលបង្កឡើង ឬទំនងជាត្រូវបានបង្កឡើងដោយសារធាតុជីវសន្តិសុខនៅលើដំបូលសត្វ មានការព្យាបាលដើម្បីធានាថា ដល់កម្រិតដែលអាចអនុវត្តបានដោយសមហេតុផល ត្រូវទប់ស្កាត់ លុបបំបាត់ ឬកាត់បន្ថយហានិភ័យជីវសន្តិសុខនោះ។

ដំណើរការ

តំបន់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយប្រើមធ្យោបាយនៃវិធីសាស្ត្រគោលដៅរួមទាំងដំណឹងអស់ដោយមិនគិតពីកម្មសិទ្ធិ ឬការកាន់កាប់ទេ។


- រាល់ការចូលទៅលើដីឯកជនត្រូវអនុវត្តទៅតាមផ្នែកទី 98 នៃច្បាប់ជីវសន្តិសុខឆ្នាំ 2015។
- ម្ចាស់ដីឯកជន និងអ្នកកាន់កាប់ក្នុងតំបន់ដែលបានជ្រើសរើសនឹងត្រូវបានចេញលិខិតមួយដោយណែនាំថា ការត្រួតពិនិត្យអចលនទ្រព្យរបស់ពួកគេនឹងធ្វើឡើងដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណស្មៅចង្រៃជាអាទិភាពណាមួយ។
- នៅពេលត្រួតពិនិត្យ ប្រសិនបើស្មៅចង្រៃជាអាទិភាពណាមួយត្រូវបានកំណត់ឃើញនៅលើអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកសំណាកនៃប្រភេទស្មៅចង្រៃនីមួយៗនឹងត្រូវបានដាក់ស្លាកដោយបងប្អូនភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីជួយអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណស្មៅចង្រៃទាំងនោះ និងស្មៅចង្រៃផ្សេងទៀតដែលអាចកើតមាននៅលើអចលនទ្រព្យ។
- ប្រសិនបើស្មៅចង្រៃត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ អ្នកនឹងត្រូវបានគេចេញលិខិត "វត្តមានស្មៅចង្រៃជាអាទិភាព" ហើយត្រូវបានស្នើសុំឱ្យគ្រប់គ្រងស្មៅចង្រៃដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងរយៈពេលកំណត់ដែលនឹងត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងលិខិតនោះ។ កាលបរិច្ឆេទនៃការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញក៏នឹងត្រូវបានផ្តល់ផងដែរ។ លិខិតនឹងរួមបញ្ចូលបញ្ជីនៃស្មៅចង្រៃដែលបានរកឃើញ ហើយអ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់ព័ត៌មានដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់វា។
- ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយទាក់ទងនឹងផ្នែកណាមួយនៃលិខិត "វត្តមានស្មៅចង្រៃជាអាទិភាព" សូមទាក់ទងសាលាក្រុង Fairfield តាមទូរសព្ទលេខ 9725 0222។



ដើមបន្លាដំបងយក្ខ Tiger pear

ក្រុមការងារស្មៅចង្រៃជីវសន្តិសុខ

ដំណើរការត្រួតពិនិត្យអចលនទ្រព្យឯកជន ច្បាប់ជីវសន្តិសុខឆ្នាំ 2015



ស្មៅចង្រៃជាអាទិភាពរបស់រដ្ឋ៖ ការបង្ការ

ទំនាក់ទំនងជាមួយសាលាសង្កាត់



Black knapweed
Centaurea x moncktoni



Bridal veil creeper
Asparagus declinatus



Eurasian water milfoil
Myriophyllum spicatum

ប្រជាពលរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចដែលអាចអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបង្ការ លុបបំបាត់ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យជីវសន្តិសុខដែលបង្កឡើងដោយសារធាតុដែលបានហាមឃាត់។

ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យនៅមូលដ្ឋានអំពីវត្តមាននៃសារធាតុដែលបានហាមឃាត់ ឬបានសង្ស័យថាជាសារធាតុដែលបានហាមឃាត់។



វត្តជាតិអណ្តែតលើទឹកស្លឹកតូចៗ (Frogbit) / វត្តជាតិអេប៉ុង (Sponge plant)
Limnobium spp. (ត្រប់ប្រភេទ)



ស្មៅ Gamba
Andropogon gayanus



Hawkweed
Pilosella spp. (ប្រភេទទាំងអស់លើកលែងតែ *Hieracium murorum*)



Hydrocotyle / Water pennywort
Hydrocotyle ranunculoides



ស្មៅរោមសត្វមីកស៊ីក
(Mexican feather grass)
Nassella tenuissima
(syn. *Stipa tenuissima*)



ស្មៅចង្រៃ Parthenium
Parthenium hysterophorus




ផ្លែប៉ោម Pond apple
Annona glabra



Knapweed ដែលបានរកឃើញ
Centaurea stoebe subsp. australis



Water caltrop
Trapa spp. (គ្រប់ប្រភេទ)



Water soldier
Stratiotes aloides



Yellow burrhead
Limnocharis flava

ស្មៅចង្រៃជាអាទិភាពរបស់រដ្ឋ៖ ការលុបបំបាត់


វិធានការគ្រប់គ្រង៖ ត្រូវលុបបំបាត់រុក្ខជាតិពិស ហើយបង្ក្រាប និងបង្ហាញវាជាបន្តបន្ទាប់ ហើយត្រូវរក្សាដីទុកមិនឱ្យមានរុក្ខជាតិនេះ។ មិនត្រូវលក់រុក្ខជាតិនានានៅក្នុងរដ្ឋ NSW។

- កាត់ និងលាបពណ៌ ● ការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ - ការចូតដើម ● ការដកចេញដោយដៃ ● ការបាញ់ថ្នាំ ● ការដកចេញដោយម៉ាស៊ីន
● ទំនាក់ទំនងជាមួយសាលាសង្កាត់ ● ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វដែលស៊ីស្មៅជាអាហារ ● ការគ្រាក់កាប់ និងការដាក់សំរាមគ្របកុំឱ្យដីហូត



Bitou bush

Chrysanthemoides monilifera
subsp. *Rotundata*



Boneseed

Chrysanthemoides monilifera
subsp. *Monilifera*



ផ្លែប៉ោមស្លេងត្រូពិច
(Tropical soda apple)

Solanum viarum

ស្មៅចង្រៃជាអាទិភាពរបស់រដ្ឋ៖ ការបង្ក្រាប

វិធានការគ្រប់គ្រង៖ ត្រូវលុបបំបាត់រុក្ខជាតិពិស ហើយបង្ក្រាប និងបង្ហាញវាជាបន្តបន្ទាប់ ហើយត្រូវរក្សាដីទុកមិនឱ្យមានរុក្ខជាតិនេះ។ មិនត្រូវលក់រុក្ខជាតិនានានៅក្នុងរដ្ឋ NSW។

- កាត់ និងលាបពណ៌ ● ការបាត់ និងការបំពេញដើម ● ការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ - ការចូតដើម ● ការស្រោបផ្នែកដើមដែលជាប់ឫស
● ការបាញ់ថ្នាំ ● ការដកចេញដោយម៉ាស៊ីន ● ទំនាក់ទំនងជាមួយសាលាសង្កាត់ ● ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វដែលស៊ីស្មៅជាអាហារ
● ការគ្រាក់កាប់ និងការដាក់សំរាមគ្របកុំឱ្យដីហូត ● កាត់ផ្នែកដើមដែលជាប់ឫស




African boxthorn

Lycium ferocissimum



ស្មៅចង្រៃ Asparagus

Asparagus aethiopicus



Blackberry

Rubus fruticosus app.

ស្មៅចង្រៃជាអាទិភាពរបស់រដ្ឋ៖ ការបង្ក្រាប


វិធានការគ្រប់គ្រង៖ ត្រូវលុបបំបាត់រុក្ខជាតិពិស ហើយបង្ក្រាប និងបង្ការជាបន្តបន្ទាប់ ហើយត្រូវរក្សាដីទុកមិនឱ្យមានរុក្ខជាតិនេះ។ មិនត្រូវលក់រុក្ខជាតិនានានៅក្នុងរដ្ឋ NSW។



Cape broom
Genista monspessulana



Cabomba
Cabomba caroliniana



Cat's claw creeper
Dolichandra unguis-cati




Chilean needle grass
Nassella neesiana



Fireweed
Senecio madagascariensis



Gorse
Ulex europaeus



Lantana
Lantana camara


- កាក និងលាបពណ៌
- ការចាក់ និងការបំពេញដើម
- ការដកចេញដោយដៃ
- កោស និងលាបពណ៌
- ការបាញ់ថ្នាំ
- ការដកចេញដោយម៉ាស៊ីន
- ទំនាក់ទំនងជាមួយសាលាសង្កាត់
- ការត្រួតពិនិត្យ និងការដាក់សំរាម
- គ្របកុំឱ្យដីហូត
- ការគ្រប់គ្រងជីវសាស្ត្រ



ដើមវល្លិ៍ Madeira vine
Anredera cordifolia

ស្មៅចង្រៃជាអាទិភាពរបស់រដ្ឋ៖ ការបង្ក្រាប

វិធានការគ្រប់គ្រង៖ ត្រូវលុបបំបាត់រុក្ខជាតិពិសី ហើយបង្ក្រាប និងបំបាត់រុក្ខជាតិបន្តបន្ទាប់ ហើយត្រូវរក្សាដីទុកមិនឱ្យមានរុក្ខជាតិនេះ។ មិនត្រូវលក់រុក្ខជាតិនានានៅក្នុងរដ្ឋ NSW។



ផ្លែដំបងយក្ខ Prickly pear (ធម្មតា)
Opuntia spp. (មិនរាប់បញ្ចូល
O.ficus-indica), Cyllindropuntia spp.
និង Austrocyllindropuntia



ដំបងយក្ខ Smooth tree pear
Opuntia monacantha




Sagittaria
Sagittaria platyphylla



Salvinia
Salvinia molesta



Serrated tussock
Nassella trichotoma



ឆើមស្ល (Willows)

ប្រភេទ *Salix* លើកលែងតែ *S. babylonica*, *S. X calodendron* និង *S. x reichardtii* (willows លើកលែងតែ weeping willow, pussy willow និង sterile pussy willow)

- កាក និងលាបពាណ៌
- ការចាក់ និងការបំពេញដើម
- ការដកចេញដោយដៃ
- ការស្រោបផ្នែកដើមដែលជាប់ឫស
- ការបាញ់ថ្នាំ
- ការដកចេញដោយម៉ាស៊ីន
- ទំនាក់ទំនងជាមួយសាលាសង្កាត់
- ការគ្រប់គ្រងជីវសាស្ត្រ

ស្មៅចង្រៃជាអាទិភាពនៅក្នុងតំបន់៖ ការបង្ការ

សារធាតុដែលបានហាមឃាត់៖ វាជាបទល្មើសក្នុងការលក់ដូរឬកេរស្មៅចង្រៃណាមួយដែលបានហាមឃាត់នានាដែលមានរាយក្នុងតារាងទី 2 ផ្នែកទី 1 នៃច្បាប់ជីវសន្តិសុខរដ្ឋ NSW ឆ្នាំ 2015។



hygrophila ឥណ្ឌាខាងកើត
Hygrophila polysperma



ស្មៅកន្ទុយកណ្តុរយក្ខ
(Giant rats tail grass)
Sporobolus pyramidalis



Spanish broom
Spartium junceum

ស្មៅចង្រៃទាំងនេះបង្កបង្កើនមិនត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ បង្កហានិភ័យជីវសន្តិសុខដ៏សំខាន់ និងការទប់ស្កាត់ហានិភ័យជីវសន្តិសុខដែលបង្កឡើងដោយស្មៅចង្រៃទាំងនេះគឺជាគោលបំណងជាក់ស្តែងដែលសមហេតុផល។

មិនត្រូវលក់នៅក្នុងមហាតំបន់ស៊ីដនី (Greater Sydney) ទេ។

- កាក និងលាបពាណ៌ ● ការដកចេញដោយដៃ ● ការស្រោបផ្នែកដើមដែលជាប់ឫស ● ការបាញ់ថ្នាំ ● ការដកចេញដោយម៉ាស៊ីន
- ទំនាក់ទំនងជាមួយសាលាសង្កាត់ ● ការគ្រប់គ្រងជីវសាស្ត្រ



ចកទឹក (Water lettuce)
Pistia stratiotes



ស្មៅ Water star grass
Heteranthera zosterifolia

ស្លោតព្រៃអាទិភាពនៅក្នុងតំបន់៖ ការលុបបំបាត់




ស្លោតព្រៃ Chinese knotweed
Persicaria chinensis



Climbing asparagus
Asparagus africanus




Coral creeper
Barleria repens



Glory lily
Gloriosa superba



Grey sallow
Salix cinerea



Groundsel bush
Baccharis halimifolia



Holly-leaved senecio
Senecio glastifolius



Kei apple
Dovyalis caffra



Kidney leaf mud plantain
Heteranthera reniformis


វិធានការគ្រប់គ្រង៖ រាជាបទល្មើសក្នុងការលក់ដូរប្រភេទស្លាចង្រែដែលបានហាមឃាត់នានាដែល
មានរាយក្នុងតារាងទី 2 ផ្នែកទី 1 នៃច្បាប់ជីវសន្តិសុខរដ្ឋ NSW ឆ្នាំ 2015។



Leaf cactus
Pereskia aculeata



Ming asparagus fern
Asparagus macowanii var.



Nodding thistle
Carduus nutans subsp. *nutans*



ឆើមរ្សី Skunk vine
Paederia foetida

គោលបំណងនៃការគ្រប់គ្រងសម្រាប់តំបន់ស៊ីដនី

ស្លាចង្រែទាំងនេះឃើញមានក្នុងការចែកចាយដ៏កំណត់។
អាទិភាពក្នុងតំបន់គឺការលុបបំបាត់ស្លាចង្រែទាំងនេះចេញពីមហាតំបន់ស៊ីដនី។

- កាត់ និងលាបពណ៌
 ● ការបាក់ និងការបំពេញដើម
 ● ការដកចេញដោយដៃ
 ● កោស និងលាបពណ៌
 ● ការស្រោបផ្នែកដើមដែលជាប់ឫស
- ការបាញ់ថ្នាំ
 ● ការដកចេញដោយម៉ាស៊ីន
 ● ទំនាក់ទំនងជាមួយសាលាសង្កាត់
 ● ការត្រួតពិនិត្យ និងការដាក់សំរាមគ្របកុំឱ្យដីហូត
- ការគ្រប់គ្រងជីវសាស្ត្រ

ស្មៅចង្រៃជាអាទិភាពនៅក្នុងតំបន់៖ ការបង្ក្រាប

វិធានការគ្រប់គ្រង៖ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃប្រភេទពូជនានានៅតំបន់ ឬផ្នែកទាំងអស់។ ផ្នែកទី 2។
ផ្នែកទី 69 (f) នៃច្បាប់ជីវសន្តិសុខរដ្ឋ NSW ឆ្នាំ 2015។




African Olive

Olea europaea subsp. cusidata



Asparagus fern

Asparagus virgatus



Black willow

Salix nigra



Senegal tea

Gymnocoronis spilanthoides



Sicklethorn

Asparagus falcatus



ដើមបន្លាដបងយក្ខ Tiger pear

Opuntia aurantiaca



Water poppy

Hydrocleys nymphoides

- កាត់ និងលាបពណ៌
- ការដកចេញដោយដៃ
- ការស្រោបផ្នែកដើមដែលជាប់ឫស
- ការបាញ់ថ្នាំ
- ការដកចេញដោយម៉ាស៊ីន
- ទំនាក់ទំនងជាមួយសាលាសង្កាត់
- ការត្រួតពិនិត្យ និងការដាក់សំរាម គ្រប់គ្រងដីកម្រិត

ស្មៅចង្រៃជាអាទិភាពនៅក្នុងតំបន់៖ ការការពារទ្រព្យសម្បត្តិ

វិធានការគ្រប់គ្រង៖ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃស្មៅចង្រៃទៅកាន់ទីតាំងសំខាន់ៗ/ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ឬកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើទឹកឆ្នែងទាំងនេះ ប្រសិនបើការរីករាលដាលបានកើតឡើងរួចហើយ។



ស្មៅក្រពើ (Alligator weed)


Alternanthera philoxeroides

- កាត់ និងលាបពាណ៌
- ការដកចេញដោយដៃ
- ការស្រោបផ្នែកដើមដែលជាប់ឫស
- ការបាញ់ថ្នាំ
- ការដកចេញដោយម៉ាស៊ីន
- ទំនាក់ទំនងជាមួយសាលាសង្កាត់
- ការគ្រាក់កាប់ និងការដាក់សំរាមគ្រប់គ្នាឱ្យដិត
- កោស និងលាបពាណ៌



ដើមត្រែងយក្ស (Giant reed)

Arundo donax



Green cestrum

Cestrum parqui



Ludwigia

Ludwigia peruviana



ស្មៅ Pampas grass

ប្រភេទ *Cortaderia*



Scotch/English broom

Cytisus scoparius



កំជ្លោក (Water hyacinth)

Eichhornia crassipes

វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងស្មៅចង្រៃ

នៅក្រោមផ្នែកទី 3 នៃច្បាប់ជីវសន្តិសុខឆ្នាំ 2015 - កាក្សកិច្ចជីវសន្តិសុខទូទៅចែងថាបុគ្គលណាម្នាក់ដែលដឹង ឬគួរតែដឹងដោយសមហេតុផល ពីហានិភ័យជីវសន្តិសុខដែលបង្កឡើង ឬទំនងជាត្រូវបានបង្កឡើងដោយសារធាតុជីវសន្តិសុខនៅលើដីរបស់ពួកគេ ត្រូវមានការព្យាបាលជីវសន្តិសុខដើម្បីធានាថា ដល់កម្រិតដែលអាចអនុវត្តបានដោយសមហេតុផល ត្រូវទប់ស្កាត់ លុបបំបាត់ ឬកាត់បន្ថយហានិភ័យជីវសន្តិសុខនោះ។

ការវិចារណាអំពីសុវត្ថិភាព - ការប្រុងប្រយ័ត្នទូទៅខាងក្រោមគួរតែបានធ្វើឡើងនៅពេលប្រើថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ។ អានស្លាកមុនពេលបើកធុង ហើយធ្វើតាមការណែនាំនានា។

ពាក់សម្លៀកបំពាក់ការពារដូចដែលបានណែនាំនៅលើស្លាក ហើយលាងដៃក្រោយពេលប្រើ និងមុនពេលបរិភោគអាហារ។

កំនូរព្រាងទាំងអស់ដោយ Virginia Bear

● កាត់ និងលាបពណ៌

មានប្រយោជន៍សម្រាប់ស្មៅចង្រៃដើមឈើដែលមានទំហំតូច ទៅមធ្យមដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 10 សង់ទីម៉ែត្រ។

ធ្វើការកាត់ផ្នែកឱ្យជិតដីតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដោយប្រើកូនកន្ត្រៃកាត់មែកឈើ ឬកន្ត្រៃកាត់មែកឈើ ហើយលាបថ្នាំខាងលើ Glyphosate ភ្លាមៗទៅលើផ្នែកដែលលាតត្រដាង។


កុំឱ្យផ្លែត្រូវបានគ្របដោយដី។

គួរលាបសារធាតុគីមីក្នុងរយៈពេល 30 វិនាទីបន្ទាប់ពីបានកាត់។

● កាត់ផ្នែកដើមដែលជាប់ឫស

សម្រាប់ការព្យាបាល Blackberry។ កោសដីដែលនៅជុំវិញគល់រុក្ខជាតិនីមួយៗ រហូតទាល់តែមើលឃើញមើម (កន្លែងដែលផ្នែកដើមឈើលេចចេញមក)។


ដោយប្រើកូនកន្ត្រៃកាត់មែកឈើ ឬកន្ត្រៃកាត់មែកឈើ កាត់ឫសត្រង់ចំណុចជប់ផុត ហើយលាបថ្នាំខាងលើ Glyphosate ឱ្យបានភ្លាមៗ។



● ការចាក់ និងការបំពេញដើម

នៅក្នុងគល់ដើមឈើ ខ្នងរន្ធនៅមុំ 45 ដឺក្រេ ចូលទៅក្នុងសំបកឈើ (នៅក្រោមសំបកខាងក្រៅ) នៅចន្លោះស្រោមដៃពីរ ជុំវិញគល់ទាំងមូលនៃដើមឈើ ចាក់ចែងដំណើរការនេះម្តងទៀតនៅខាងក្រោមមែកដែលទាបបំផុត។

កាត់ចូលទីក្នុងសំបកឈើដោយប្រើពន្លាក ឬពូថៅ។ បំពេញរន្ធ/កន្លែងកាត់នីមួយៗដោយប្រើថ្នាំសម្លាប់ស្មៅឱ្យបានភ្លាមៗ។



ការពិចារណាសម្រាប់ការចាក់ និងការបំពេញដើម

រុក្ខជាតិគួរតែមានសុខភាពល្អ និងលូតលាស់យ៉ាងសកម្ម។

គួរតែព្យាបាលរុក្ខជាតិ Deciduous នៅនិទាឃរដូវ និងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ នៅពេលស្លឹកដុះចេញយ៉ាងពេញលេញ។

ចំពោះរុក្ខជាតិដែលមានដើមច្រើន ត្រូវចាក់ ឬចិតនៅក្រោមមែកដែល ទាបបំផុត ឬព្យាបាលដើមនីមួយៗដោយឡែកពីគ្នា។

ផ្ទុកសម្លាប់ស្មៅត្រូវតែចាក់ភ្លាមៗមុនពេលកោសិការុក្ខជាតិបិទ (ក្នុងរយៈពេល 30 វិនាទី ហើយឈប់ការប្តូរទីតាំងផ្ទុកសម្លាប់ស្មៅ)។




ការដកចេញដោយដៃ

យកគ្រាប់ពូជ ឬផ្លែឈើចេញផ្ទុមៗ ហើយដាក់ក្នុងថង់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

ចាប់មែកដល់កម្រិតដី។ អង្រែរុក្ខជាតិ Plant ទៅមុខទៅក្រោយដើម្បីបន្ថយឫស ហើយទាញចេញដោយផ្ទុមៗ។

ទុះឫសផ្ទុមៗដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីយកចេញដី។

ដាក់ជំនួសដីដែលបានយកចេញនោះ ហើយស្តាប់ចុះក្រោម។



កោស និងលាបពាណ៌


ប្រើកាំបិត កោសដើមរហូតដល់ 1 ម៉ែត្រ រហូតទៅដល់ស្រទាប់ខាងក្រោមសំបក/ ស្រទាប់ខាងក្រៅ។ បាញ់ផ្ទុកសម្លាប់ស្មៅភ្លាមៗនៅតាមបណ្តោយកន្លែងកោស។

ការពិចារណា

គួរតែកោសពាក់កណ្តាលបន្ទាត់ផ្ចិតនៃទងជាអតិបរិមា។

កុំស្រោបព័ទ្ធជុំវិញសំបក។ ដើមធំ ទាបជាង (> 1 សងទីម៉ែត្រ) គួរតែមានស្នាម កោសពីរទល់មុខគ្នា។

អាចព្យាបាលដើមរុក្ខជាតិនៅលើដើមឈើបន្ទាប់ពីការព្យាបាល លើកលែងតែ ដើមរុក្ខ Maderia។




● **ការស្រោបផ្នែកដើមដែលជាប់ឫស**

យកដើមចេញផ្ទៃម្យ៉ាង ហើយខ្ទប់ជាមួយក្រាប់ ឬផ្លែ។


ចាប់ស្លឹក ឬដើមឱ្យជាប់គ្នា ដើម្បីឱ្យអាចមើលឃើញគល់រុក្ខជាតិ។

សិកក់បិក ឬដងថ្នឹងនៅចម្ងាយ នៅក្បែរ 'ផ្នែកដើមដែលជាប់ឫស'។ កាត់ឫសទាំងអស់នៅជុំវិញផ្នែកដើមដែលជាប់ឫស។ យកចេញផ្នែកដើមដែលជាប់ឫស ហើយដាក់ក្នុងថង់។



● **ការដកចេញដោយម៉ាស៊ីន**

អាចប្រើគ្រឿងចក្រឯកទេសដើម្បីដកដើមឈើ និងគល់ឈើដែលមានទំហំតូចៗទៅផង។



ការចោលសារធាតុស្លោតជ្រៃ

ស្លោតជ្រៃមានជាតិឈើជាច្រើនអាចត្រូវបានកិនកំទេចតាមរយៈកម្មវិធីកិនកំទេចនៅម្ខាងចិញ្ចើមថ្នល់ (Kerbside Chipping Program) របស់សាលាសង្កាត់ និងមជ្ឈមណ្ឌលទម្លាក់កាកសំណល់បៃតង។


ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានករណីលើកលែងមួយចំនួន។ សារធាតុស្លោតជ្រៃដូចជា Scotch ឬ Cape Broom មិនត្រូវត្រូវបានកិនកំទេចទេនៅពេលកំពុងចេញក្រាប់ពូជ។ សារធាតុស្លោតជ្រៃដែលមិនអាចកិនកំទេច គួរតែត្រូវបានបោះចោលក្នុងធុងសំរាមបៃតងរបស់អ្នក។

Willows - មិនត្រូវត្រូវបានកិនកំទេចទេ ពីព្រោះវាអាចដុះពន្លកឡើងវិញ

ឫស្សី - នេះក៏ត្រូវត្រូវបានបោះចោលទៅក្នុងធុងបៃតងរបស់អ្នកផងដែរ។

● **ការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ - ការដូតដើម**

យកក្រាប់ពូជ ឬផ្លែឈើចេញផ្ទៃម្យ៉ាង ហើយដាក់ក្នុងថង់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ដោយប្រើឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ ដូតដើម/ស្លឹក។



● **ការបាញ់ថ្នាំ**

ការពិចារណា

សូមអានស្លាកវិធីសាស្ត្រសមស្រប និងអនុវត្តអត្រាសម្រាប់រុក្ខជាតិនីមួយៗដែលកំពុងបាញ់ថ្នាំជានិច្ច។

សិក្សា និងស្វែងយល់ពីរបៀបដែលថ្នាំសម្លាប់ស្មៅដំណើរការ - សម្រាប់ប្រភេទដើម និង មើមរាងមូល ពេលវេលាដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺក្រោយពេលចេញផ្កា និងមុនពេលចេញផ្លែ។

តើអ្នកបានដោះស្រាយបញ្ហាសុវត្ថិភាពទាំងអស់ហើយឬនៅ?



[illegible]

[illegible]



រុក្ខជាតិផ្លាស់ប្តូរពីប្រភេទដីគង្គ និងដីក្រស



**សាលាសង្កាត់នឹងរីករាយក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន
បន្ថែម។**

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង៖

សាលាក្រុង Fairfield (Fairfield City Council)
86 Avoca Road, Wakeley NSW 2176
PO Box 21 Fairfield NSW 1860
(02) 9725 0222

ថ្ងៃចន្ទ ដល់ សុក្រ ពីម៉ោង 8.30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង
4.30 ល្ងាច